

Arbejdsark



Spids bøgegalmyg. Myggen lægger sine æg inde i bøgeblade, hvorefter larven udskiller hormoner der får bladet til at danne en galle. Dette er ikke skadeligt for bladet, og giver fødekilde for dyr der lever af insekter.

Kilde: BioLib <https://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/192992.jpg>



Plettet askebarkbille. Graver gange under barken på asketræer og lægger sine æg der.



Plettet askebarkbille – kanaler i asketræ.

Kilde: Fugle og natur <https://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=543556>



Oksetunge svamp. En sjælden svamp som vokser på egetræer.

Kilde: Shroomi.dk <https://www.shroomi.dk/oksetunge/>



Svovlsporesvamp. Vokser på ved af løvtræ, ofte eg. Findes dog også på poppel og pil.

Kilde: Shroomi.dk <https://www.shroomi.dk/svovlsporesvamp/>



Agern – egens frugt. En nød i en hård skal

Kilde: landbrugsinfo.dk <https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/giftige-planter/sider/agern-forgiftning.aspx>



Bog – Bøgens frugt. to nødder i blød skal

Kilde: skoven i skolen <http://www.skoven-i-skolen.dk/content/b%C3%B8g-fagus-sylv%C3%A1tica>



Ahornens frugt. To nødder med vinger, som kan flyve med vinden.

Kilde: Natur for alle <http://naturforalle.dk/kroghsgade-vuggestue/>